COMMENT AND REVIEWS

BEMERKUNGEN ZU DER ARBEIT VON O. H. FRANKEL :

A Polymeric multiple gene change in hexaploid wheat

ALFRED LEIN

Saatzucht Ferdinand Heine, Schnega/Hannover, W. Germany

Received 11.xi.50

In einer F_5 -Familie der Weizenkreuzung Tuscan $\times$ White Fife entdeckte Frankel 1933/34 zwei genetische Abnormalitäten, die er in dankenswerter Weise über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgte und ausführlich analysierte. Der eine Fall wurde als strukturelle Mutation (Duplikation) aufgeklärt (1). Der zweite Fall betrifft einen gleichzeitig entstandenen Chlorophylldefekt vom Typ *striato-virescens* (2).

An dieser die Chlorophyllbildung betreffenden Mutation ist besonders bemerkenswert, dass sich in Kreuzungen mit normalgrünen Genotypen eine polyfaktorielle Aufspaltung zeigte. Mit dem einen Elter der Ausgangskreuzung Tuscan und mit einer nicht verwandten Varietät Hunters ergab sich eine 3-faktorielle Aufspaltung. Mit dem zweiten Elter der Ausgangskreuzung ebenfalls eine 3-faktorielle, vielleicht sogar eine 4-faktorielle Aufspaltung. Die Aufspaltungen wurden durch F_2 -Daten, für die Kreuzungen mit Tuscan und Hunters auch durch F_3 -Daten nachgewiesen.

Cytologisch zeigten die Eltern der Ausgangskreuzung, wie auch deren F_1 und F_2 in später wiederholten Kreuzungen, keine besonderen Unregelmässigkeiten. Hervorzuheben ist aber, dass die chlorophyllmutante Linie, die allerdings erst drei Generationen nach ihrer Entdeckung untersucht wurde, die Duplikation, d.h. die gleichzeitig entdeckte strukturelle Mutation ebenfalls enthält. Die Kombination der genetischen Daten und der cytologischen Befunde aus den Kreuzungen mit den Elternvarietäten Tuscan und White Fife zeigen jedoch, dass die Aufspaltungen des Chlorophylldefektes von den chromosomalen Verhältnissen unabhängig sind.

Zur Erklärung der auffallenden Tatsache einer polyfaktoriellen Vererbung des Chlorophylldefektes erörtert Frankel folgende Möglichkeiten:

(a) Drei Mutationen in einer polymeren Serie des hexaploiden Weizens sind unabhängig voneinander aufgetreten. Diese Möglichkeit ist als äusserst unwahrscheinlich abzutun.

(b) Ein einzelnes mutiertes Allel ist durch autosyndetische Paarungen auf alle drei homologen Chromosomenpaare des hexaploiden Weizens übertragen worden. Auch diese Möglichkeit wird von Frankel auf Grund der sonstigen Befunde mit Recht abgelehnt.

(c) Es handelt sich um eine gleichzeitige Vielfachmutation, wobei die Gleichzeitigkeit durch besondere Verhältnisse im Genotyp selbst begründet ist. Ein zufälliges Zusammentreffen der strukturellen Mutation mit der Chlorophyllmutation ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Letztere eine Folge der strukturellen Mutation ist, dass die Gleichgewichtsstörung durch die Duplikation die "Elemente der Erblichkeit destabilisiert"

hat. Frankel hält also an der Annahme fest, dass es sich um eine multiple Mutation handelt und zieht daraus weitere Folgerungen über die Evolution und genetische Differenzierung polyploider Arten.

Auf Grund der eigenen Arbeiten an röntgeninduzierten Mutationen bei Gerste (3), unter denen bekanntlich Chlorophyllmutationen in grosser Zahl auftreten, wurden die Probleme der Mutabilität, der Genmanifestierung und der Genwirkung in Bezug auf den Mechanismus der Chlorophyllbildung eingehend durchdacht. Aus diesen Erfahrungen heraus sei darauf hingewiesen, dass die bisher durch Frankel vorgelegten experimentellen Daten durch einen einfachen Mutationsschritt und zwar durch eine wahrscheinlich mit der Strukturmutation in Zusammenhang stehende *Deletion* zu erklären sind; allerdings unter der Hypothese, dass in der Vorgeschichte der Ausgangskreuzung eine stille Ansammlung von Allelunterschieden, die den Chlorophyllbildungsmechanismus betreffen, stattgefunden haben muss.

Diese Hypothese stände aber in Einklang mit den sonstigen Konzeptionen über die Manifestierung von Mutationen in polyploiden Arten und erforderte keine zeitliche Einschränkung für die einzelnen Mutationsprozesse. Damit würden die weitgehenden allgemeineren Schlussfolgerungen von Frankel über die Mutabilität in polyploiden Arten hinfällig, wenn sie auch durch ähnliche Literaturangaben, die von Frankel zitiert sind, gestützt sein könnten.

Es sei davon ausgegangen, dass die Kreuzungen der Mutante mit Tuscan und Hunters eine 3-faktorielle, mit White Fife eine 4-faktorielle Aufspaltung zeigen. Die genetische Konstitution von White Fife sei *ABCdeX* (homozygot), von Tuscan *abcDEX*, von Hunters etwa *abCDeX*. Aus der Kreuzung White Fife $\times$ Tuscan können also Genotypen der Formel *abcdeX* herauspalten. Unter der Annahme, dass das Allel X über alle sonstigen rezessiven Allele epistatisch ist, sind alle bisher genannten Genotypen normal grün. Alle Allelunterschiede, die irgendwann entstanden sein können, können sich nicht manifestieren, da sie in Gegenwart von X die Chlorophyllbildung nicht stören können. Sie werden jedoch wirksam, sobald das epistatische Gen von X zu *x* mutiert oder durch Deletion verloren geht.

Der Genotyp *abcdex* ist chlorophylldefekt. Kreuzungen dieser Mutante ergeben mit den Genotypen der Ausgangskreuzung entsprechend den experimentellen Befunden Frankels eine 3- bzw. 4-faktorielle Aufspaltung. Ebenfalls gibt der oben für die Varietät Hunters gewählte Genotyp eine 3-faktorielle Aufspaltung. Die Allelkombinationen sind dabei willkürlich aus einer Reihe verschiedener Möglichkeiten herausgegriffen. Selbstverständlich müsste auch jedes der Allele A, B, C, D, E über das Allel *x* epistatisch sein, d.h. die Wirkung des Allels X ersetzen können. Unter Berücksichtigung der Hexaploidie der Art mit je drei Paaren homologer Chromosomen wäre also für die Chlorophyllbildung ein Minimum von zwei Loci anzunehmen, wobei die Kennzeichnung der Allele sinnvoll durch A_1-a_1 , A_2-a_2 , A_3-a_3 und X_1-x_1 , X_2-x_2 , X_3-x_3 erfolgte. Bezüglich der Genwirkung wäre anzunehmen, dass sich die Loci A und X wechselseitig ersetzen können, und dass eine "Alles oder Nichts"—Reaktion in dem Sinne vorliegt, dass ein einziges dominantes Allel A oder X genügt, um die normale Chlorophyllbildung sicherzustellen.

Die Hypothese liesse sich relativ einfach, wenn auch mit nicht geringem Arbeitsaufwand, prüfen, indem Aufspaltungen der Kreuzungen Tuscan $\times$

White Fife, bzw. Tuscan $\times$ Hunters oder White Fife $\times$ Hunters in ihrem Allelgehalt durch Kreuzungen mit der mutanten Linie getestet würden. Die bisher von Frankel vorgelegten Daten stehen mit dieser Hypothese durchaus im Einklang, sie genügen jedoch nicht als Beweis für ihre Richtigkeit. Sicherlich ist aber das Zusammentreffen des Chlorophylldefektes mit der Strukturmutation nicht zufällig. Dies bezieht sich auch auf den Hinweis, dass eine Linie mit einem telozentrischen Chromosom, bei dem der Arm mit der Duplikation fehlt, chlorophylldefekt ist: nicht "incidentally", sondern "necessarily".

- (1) FRANKEL, O. H. 1949. A self-propagating structural change in Triticum I and II. *Heredity*, 3, 163-194, 293-318.
- (2) FRANKEL, O. H. 1950. A polymeric multiple gene change in hexaploid wheat. *Heredity*, 4, 103-116.
- (3) FREISLEBEN, R., UND LEIN, A. 1943. Vorarbeiten zur züchterischen Auswertung röntgeninduzierter Mutationen I und II. *Zts. f. Pflanzenzüchtg.*, 25, 235-283.

REVIEWS

INHERITANCE IN DOGS, with Special Reference to Hunting Breeds. Ojvind Winge. 1950. Comstock Publishing Company. \$3.50.

A new book by Ojvind Winge cannot fail to be something of an event in genetic literature, for perhaps no living author has added so much to the diversity of genetic knowledge, or to our understanding of such a variety of genetic situations. It is particularly valuable that he has in this book put together what is known of the genetics of the dog, which has shared with many other domestic animals a neglect from which it is quite time they were rescued.

Most conclusions in this field are without explicit experimental verification, for I believe that nowhere have identifiable genes been deliberately collected, whereby authentic specimens of the various breeds might be tested. Knowledge has been accumulated piecemeal, and identifications have not always been verified by breeding tests. Nevertheless, the author has been able to list sixteen factors affecting colour, and to give some account of their interaction, and these should cover the principal segregations observable in the breeding of gun-dogs, to which the illustrative material is principally devoted. This list is a step in the direction of a standard notation for dog genetics, though no very radical reform of current usage is here proposed. For example, the extreme dilution of the Samoyed, caused by a recessive gene *f*, is here spoken of as albino, although true pink-eyed albinos admittedly occur, and are ascribed to a different recessive gene. It is not stated whether or not it is allelomorphic.

A clear introductory account of genetic principles is given, with illustrations of factor interaction and epistasy. This should enable the intelligent dog breeder to see what he is doing, and to make an analysis of his stocks so far as colour inheritance is concerned.

No case of linkage is mentioned, apart from Hutt's remarkable finding of sex-linked hæmophilia. This is not surprising as there are 38 pairs of autosomes. Analogies with colour factors in other species are not discussed, though the factor for white mottling, *t*, is closely analogous to the factor *s* in mice for recessive pied, and this analogy discourages the suggestion that the great range in the extent of colour in mottled dogs is due to multiple