ヒトの発癌機構研究モデルとしての網膜芽細胞腫

松 永 英

(国立遺伝学研究所・人類遺伝部)

Retinoblastoma: A Model for the Study of Carcinogenesis in Humans*

Ei MATSUNAGA

*Department of Human Genetics, National Institute
of Genetics, Mishima 411, Japan*

Summary It is generally accepted that the overall process of carcinogenesis, with its long latent period, usually comprises at least two steps, initiation and promotion, each of which is probably controlled or modified by genetic and environmental factors. Retinoblastoma is a malignant neoplasm arising from the transformation of an embryonic retinal cell that may involve the minimal number of carcinogenic steps. For this and several other reasons, it is a cancer most suitable for studying the mechanisms of carcinogenesis in humans. This article reviews recent studies on the genetics and genesis of retinoblastoma with special reference to the host resistance theory proposed by the author (Matsunaga, 1978; 1979). Main conclusions are as follows:

- 1) Among all retinoblastomas, the ratio of unilateral to bilateral cases is approximately 2:1. The vast majority occur sporadically, and familial cases represent less than 5% (Table 1). Follow-up studies of survivors of sporadic cases showed that all bilateral and about 10% of the unilateral cases are of the hereditary form, the rest being nonhereditary and presumably due to somatic mutation. Thus, of all sporadic cases that are heritable, the ratio of unilateral to bilateral disease is estimated at 0.17:0.83. Although sporadic cases may contain a few inherited from an unaffected carrier parent, this ratio may be regarded approximately as referred to the general population who developed retinoblastoma as a result of fresh germinal mutation in the gonads of a healthy parent.
- 2) There are two types in the hereditary form; one is attributable to an autosomal dominant gene with variable penetrance and expressivity, and the other, referred to a minority

*Special communication presented at the 27th Annual Meeting of the Japan Society of Human Genetics, 1982. Contribution No. 1461 from the National Institute of Genetics, Japan.

of cases usually accompanied by developmental retardation, is associated with chromosomal deletion of 13q14. Fifty-seven cases of the deletion type, collected from the literature, included 25 unilateral and 32 bilateral cases (Table 2). Most of them were sporadic in origin, while some were familial, transmitted from a parent carrying an insertional translocation (Strong *et al.*, 1981); in the latter instance, the non-expression of retinoblastoma in the parent was due to the balanced type of translocation and not to any host resistance factor. Therefore, with respect to host factors, the 57 cases are comparable to those sporadic cases that are heritable owing to the mutant gene. Comparison of the distribution of unilateral and bilateral cases between the two groups reveals a significant excess of unilateral disease in the cases associated with 13q—, indicating somewhat reduced carcinogenic potential of deletion of 13q14 as compared with the mutant gene. Since the gene has been assigned to 13q14 by linkage to Esterase D (Sparkes *et al.*, 1982), this finding suggests that the mutant gene is probably not of null type.

3) Analysis of two-generation data from published pedigrees with familial cases of retinoblastoma showed that not only penetrance of the gene in children but also expressivity, as measured by the proportion of bilateral disease or age at diagnosis of the affected children, vary consistently with the degree of expressivity in the carrier parents (Tables 3–5). Maternal effect can be excluded because the variation in expressivity in the affected children did not change with the sex of the parents who transmitted the gene. The possibility of multiple alleles with different penetrance and expressivity can also be ruled out because all the three phenotypes occurred frequently among members of the same family who share the identical mutant gene. The distribution of the three phenotypes among the gene carriers is consistent with a multifactorial model with two thresholds (Fig. 1), but not with the two-mutation model (Knudson, 1971). These findings indicate that inherited host resistance plays a significant role in the malignant transformation of an already initiated or mutated cell.

4) Although the transmission pattern of retinoblastoma in certain kindreds showing affected collateral relatives who were connected *via* unaffected persons may be explained by a chromosomal mechanism as well as by successive selection of host resistance genes, the possibility of delayed mutation cannot be excluded. However, examination of these pedigrees revealed no sign of cytoplasmic inheritance associated with a vertically transmitting virus.

5) In most bilateral cases of retinoblastoma, the disease is already bilateral when the diagnosis was first made in either eye (Table 6), although the tumor in the first eye with the diagnosed disease had usually more progressed in terms of the Reese group than had the tumor in the second eye. Based on the data for sequentially bilateral cases (Table 7), the time required for a growing tumor to progress by one grade in the Reese group was estimated at less than 2 months and probably about 1 month. After removal of the bias due to the fact that the diagnosis for each eye is never independent, the correlation between ages of the patients at diagnosis in the right and left eyes was estimated at 0.82 ($p < 0.001$). This finding implies that malignant transformation of the initiated retinal

cells is controlled by host factors common to both eyes, and that the crucial event is not a mutational process, but probably an error in differentiation that could be suppressed completely in the most resistant group who could remain unaffected, but that could not be suppressed completely in the less resistant group.

6) While persons carrying the gene for retinoblastoma are prone to nonradiogenic osteosarcoma, the risk does not differ by their phenotypes. Therefore, liability to malignant transformation of retinal cells is not correlated to that of bone cells in the gene carriers. In other words, the susceptibility is tissue specific.

7) According to the host resistance theory, patients with early-onset bilateral retinoblastoma represent the most susceptible group. Since the ABO blood-group distribution in those patients was essentially the same as that in the general population, it is concluded that the ABO blood groups are not involved in the inherited host susceptibility to the development of this tumor.

1. ま え が き

動物を用いた化学発癌実験の結果から、1 個の正常細胞が悪性化する過程は一般に多段階で、少なくとも initiation と promotion の二相を含むとされている。このうち initiation は突発的な不可逆的变化で、遺伝子または染色体の突然変異と考えられるが、これだけでは細胞はまだ癌化しない。それに続く promotion の本体は不明であるが、このほうは徐々に進行する可逆的变化とされている (Berenblum, 1978)。遺伝学の立場からは、そのいずれの相も遺伝・環境の諸要因によって支配ないし修飾されることが類推される。

ところで網膜芽細胞腫 (R) は、次の理由から、ヒトの自然発生癌の成立機構とそれに介入する諸要因を究明するのに好適な材料である。第 1 に、生下時にかなり進行した腫瘍の発見される例が少なくないことから推論されるように、この腫瘍は胎芽期の網膜細胞が最少限のステップ (おそらく 2 段階) の変化を経て悪性化したと考えられること。第 2 に、放置すれば致死的な病気であるため、患者は必ずといってよいほど医師の診断を受けるので、地域内の患者を把握してその発生率を正確に推定しやすいこと。第 3 に、早期診断と治療によって患者の生存率が向上し親になるものがふえてきたため、遺伝学的分析にたえる家族資料が豊富にあること。第 4 に、眼底検査によって腫瘍の進行度を Reese (1976) の提唱した 5 段階に分けられること。第 5 に、1 対の器官を冒すので、患者の表現度には片眼罹患・両眼罹患といった discrete な変異があることである。

本論文では、R の発生と遺伝に関してすでに確立している観察事実を要約し、併せてその成因をめぐる遺伝仮説、とくに著者の提唱する宿主抵抗性説とその根拠について要点を述べたい。なお 1978 年ころまでの研究の概要は、Vogel (1979) の総説に紹介されているので、それとの重複はできるだけさけている。

2. 網膜芽細胞腫の発生パターンと成因

R は新生児コホートの約 2 万人に 1 人の割合で発生し、この率は日本でも欧米でもほぼ同じである (Matsunaga and Ogyu, 1959; Vogel, 1979)。性別に関係なく、片眼例と両眼例の出現比はおおよそ 2:1 で、ほとんどが散発的に発生し、家族性症例は全症例の 5% 以下である (Table 1)。この表に掲げたわれわれのデータは、北海道で 1945~1957 年の間に発生した症例の悉皆調査に基づくもの (population-based) であるのに対して、Minoda (1978) のデータは 1975-1976 年に行われた全国登録の集計 (hospital-based) であるが、両者の結果はよく一致している。

Table 1. Distribution of retinoblastoma by laterality and sporadic *versus* familial occurrence.

Author	Laterality	Sporadic	Familial	Total
Matsunaga and Ogyu (1959)	Unilateral	46	0	46
	Bilateral	22	1	23
	Total	68	1 (1.4%)	69*
Minoda (1978)	Unilateral	392	11	403
	Bilateral	179	17	196
	Total	571	28 (4.7%)	599

* Incidence: 1/22,326 infants. Of all sporadic cases that are heritable, the ratio of unilateral to bilateral disease is estimated at 0.17:0.83.

家族性症例の多くは健康な両親をもつ同胞やいとこなどの多発例であるが、治療の成功に伴って親から子への伝達例が次第にふえてきた。このような家系における R の遺伝様式は、常染色体性不規則優性パターンに合致する。言い換えると、R の発生は 1 個の常染色体性優性遺伝子によるが、保因者の表現型には非発病・片眼罹患・両眼罹患の 3 通りの場合がある。この 3 型が同一家系に共存していることは、表現度の変異の成因を考える上で重要である。

散発例の腫瘍は病理組織学的に家族性症例の腫瘍と区別できないので、以前は散発例のすべてが新生突然変異によると考えられていた。しかし散発例の患者で結婚したものを追跡調査した結果、配偶子突然変異によるもの——したがって子孫に遺伝しうるもの——は、両眼例のすべてと片眼例の約 10% であることが、今日では定説になっている (Vogel, 1979)。つまり、散発性片眼例の約 90% は非遺伝性で、このほうは同じ座位の体細胞突然変異によると想定されている。

本症患者の体細胞染色体を検査すると、ときに (全症例のおそらく 5% 以下に) 第 13 染色体の長腕の特定領域 (13q14) を含む欠失が認められる (Yunis and Ramsay, 1978)。このような症例は、欠失部分の大きさに応じて発育の遅れと先天奇形を伴うことが多い。また、13q14 バンドとエステラーゼ D 座位との間には強い連鎖のあることが報告されている (Sparkes ら, 1980)。ごく最近 Sparkes ら (1982) は、R が分離している家系についてエステラーゼ D との連鎖関係を調査した結果、本症との間に交叉例は一つもなく、R の主遺伝子座は 13q14 の上にあると結論した。

ところで著者は 1979 年当時、13q- を伴う患者 27 例を文献から集め、通常の遺伝性症例の患者群と比べたところ、13q- では片眼罹患例が多くなっていることを指摘した (Matsunaga, 1980a)。Table 2 は、その後に発表された 30 例を加えた成績である。この 57 例のほとんどは散発例であるが、なかには平衡型の転座保因者親からの遺伝例 (Strong ら, 1981; Rivera ら, 1981) もある。この場合、保因者親に R が発生しなかったのは宿主抵抗性遺伝子とは関係がない。そこで対照として、散発性遺伝性症例のうちの片眼例と両眼例の出現比 0.17:0.83 (散発例のうち両眼例のすべてと片眼例の 10% を遺伝性として、Table 1 のデータから推定) をとると、13q- 症例では片眼例が有意に多いことがわかる。このことは、13q14 の欠失による発癌効果は主遺伝子のそれに比べて低いこと、したがって、もし R の主遺伝子座が 13q14 領域に存在するのであれば、突然変異遺伝子はいわゆる null 型ではないことを示唆している。ちなみに Sasaki (1982) は、13q- 患者の皮膚線維芽細胞には二次的染色体異常が出現しないのに対して、遺伝性 R 患者由来の線維芽細胞ではそれが高頻度に出現することから、突然変異遺伝子には 13q- に認められない一種の mutator 作用があると考えている。

Table 2. Distribution of unilaterally and bilaterally affected among published cases of 13q- retinoblastoma.

	No. of cases		
	Unilateral	Bilateral	Total
Compiled by Matsunaga (1980)	9	18	27
Additional cases*	16	14	30
Total observed	25	32	57
Expected no.	9.7	47.3	57

$\chi^2=29.1$, $p<0.001$.

* Ballesta and Cruz (1978), Hida *et al.* (1980), Ward *et al.* (1980), Shinohara *et al.* (1981), Motegi 1981; 1982), Yunis *et al.* (1981), Strong *et al.* (1981), Rivera *et al.* (1981), Johnson *et al.* (1982), Hata *et al.* (1982), Motegi *et al.* (1982), Michalová *et al.* (1982).

Table 3. Some parameters in familial cases of retinoblastoma, estimated on the basis of 231 sibships from literature (Matsunaga, 1978).

Expressivity of carrier parents	Proportion of children affected	Proportion of bilaterality among affected
Unaffected	0.31 ± 0.03	$133/246=0.541$
Unilateral	0.42 ± 0.05	$96/126=0.762$
Bilateral	0.49 ± 0.05	$79/88 =0.898$

3. 家族性症例の分析

(1) 親の表現度と子の罹患率 Table 3 は、内外の文献から家族性症例を含む 231 家系を集め、これについて遺伝学的に分析した結果 (Matsunaga, 1978) をまとめたものである。数世代におよぶ大家系の場合は、発端者を含む 2 世代に関する情報だけを利用した。

これで明かなように、患児の出現率と両眼罹患例の割合は、保因者である親の表現度に応じて規則正しく変動している。親が両眼性のときの分離比は単純優性遺伝の理論比にきわめて近いが、0.50 よりやや低いことを示す証拠がある。Ellsworth (1969) の論文の 1 家系 (No. 717, A.C.) と Migdal (1976) の報告した 1 家系をみると、両眼性 R が祖父 (母) から健康な (眼底検査によって全く異常の認められない) 子を通して、孫に伝えられている。つまり、両眼罹患の親から主遺伝子を受けついても全く発病しない場合があるのである。

このような浸透率ないし表現度の変動は、すでに initiate (突然変異) した網膜芽細胞が最終的に癌化する過程、すなわち promotion にかかわるものである。この変動を生ずる機構には、次のような可能性が考えられる。

1) R の遺伝子座に、表現度の異なる複対立遺伝子、たとえば両眼を冒す amorphs と片眼のみを冒す hypomorphs (Carlson and Desnick, 1979) が存在する可能性。しかし、由来の同じ突然変異遺伝子を共有する家族でも非発病・片眼罹患・両眼罹患の場合があるし、浸透率の変動は同一家系内の同胞間にもみられる (Macklin, 1960) から、この可能性は排除される。

2) 母体効果、たとえば胎盤経由の抗腫瘍性免疫抗体の存在する可能性。しかし、患者における両

Table 4. Distribution of unaffected and unilaterally and bilaterally affected among children who inherited the retinoblastoma gene (Matsunaga, 1978).

Expressivity of carrier parents	Distribution of children who inherited the gene			
	Unaffected	Unilateral	Bilateral	Total
Unaffected	0.38	0.28	0.34	1.00
Unilateral	0.16	0.20	0.64	1.00
Bilateral	0.02	0.10	0.88	1.00

Fig. 1. Distribution of host resistance with two thresholds, T_1 and T_2 , among children who inherited the retinoblastoma gene from an unaffected carrier parent (Matsunaga, 1981).

眼罹患の割合は、保因者親の表現型に依存して変動するが、親の性別によって全く変わらない (Matsunaga, 1982) ことから、この可能性も除外される。

3) 染色体機構。Strong ら (1981) が示したように、R が健康な保因者を介して多発している家系では、保因者のなかに 13q14 領域の平衡型転座保因者が含まれている可能性がある。しかし家族性 R では、13q- 症例に多い発育のおくれは通常みられないから、このような染色体機構が浸透率の低下に大きな役割をしているとは思われない。もちろん高精度分染法によっても識別できない微小欠失が存在する可能性は残るが、片眼罹患または両眼罹患の親をもつ子供集団で浸透率が低下している事実は、このような染色体機構だけでは説明できないことに注意したい。

4) 主遺伝子の発現を抑制する抵抗性遺伝子 (複数) の存在。これに加えて、環境因子の働きによって、保因者の表現型に非発病・片眼罹患・両眼罹患の区別が生ずるとというのが、宿主抵抗性説 (Matsunaga, 1978) である。

Table 3 の数値に基づいて、R の遺伝子を受けとった子供における 3 型の分布を、その親の表現度の別に示したのが Table 4 である。これから、既知の発癌物質を動物に投与したときに現れる“系統差”と同じ意味の遺伝的個人差が、人類集団に内在していることがよくわかる。

ところで Knudson (1971) の二段階突然変異説によると、配偶子を通して突然変異遺伝子 (第 1

ヒット)を受けとった保因者では、体細胞突然変異(第2 ヒット)という random な事象によって、宿主要因に関係なく腫瘍化が左右の眼で独立に起こると仮定している。しかしこの仮定は、子の罹患率と両眼罹患率が親の表現度に応じて規則正しく変動する観察事実とは合わない。また、もし Knudson の想定するように、保因者に発生する腫瘍の数が Poisson 分布に従い、かつ左右の眼に独立に生起するのであれば、各表現型の割合は次のようになるはずである。

$$\begin{aligned} \text{非発病例} & e^{-m} \\ \text{片眼罹患例} & 2e^{-m/2}(1-e^{-m/2}) \\ \text{両眼罹患例} & (1-e^{-m/2})^2. \end{aligned}$$

ここで m は個体当たりの腫瘍の平均数。これから、次式が導かれる。

$$[\text{片眼例の割合}]^2 = 4[\text{非発病例の割合}][\text{両眼例の割合}]$$

Table 4 の観察値を使って計算してみると、上式の右辺の値は、どの場合も左辺の値の 7~10 倍も大きい。したがって、「腫瘍が両眼に独立に発生する」という Knudson の基本的想定は、事実と合わない。

一方、遺伝・環境の多因子によって規定される宿主抵抗性が集団内に正規分布し、本症遺伝子が付加されると二重のしきいによって 3 型の表現型が生ずると考えると (Fig. 1), 標準偏差で測ったしきい間の距離は、ほぼ一定に保たれているはずである。

そこで正規分布関数表を参照して、各表現型の割合からしきい間の距離を求めると、非発病親から遺伝子を受けた子供集団では 0.717, 片眼罹患の親をもつ子供集団では 0.636, 両眼罹患の親をもつ子供集団では 0.879 となる。これらの数値は、集団ごとに抵抗性の分散がいくぶん違うから厳密には相互に比較できない。しかし分散の平方根である標準偏差では差が縮小されるので、それで測ったしきい間の距離がほぼ一定なことは、宿主抵抗性が多因子遺伝の二重しきいモデルに従うことを示唆している。なお、宿主抵抗性の遺伝率は約 90% と推定された (Matsunaga, 1978)。言い換えると、宿主抵抗性の大部分が遺伝で決定されていると考えてよい。

(2) 親の表現度と患児の診断時年齢 潜伏期間の長さは、一般に病原体の毒力のみならず、宿主要因によっても影響されることはよく知られている。同じ毒力の病原体に暴露された場合には、感受性の高い個体ほど早く発病するのが普通である。遺伝性 R の症例における診断時年齢を分析することによって、保因者親の表現度と患児の診断時年齢との間に、高い相関のあることが明らかになった (Matsunaga, 1979)。

Table 5 はその結果をまとめたもので、基礎資料はわが国の文献から集録した家族性症例 (Matsu-

Table 5. Mean age of patients at diagnosis of inherited cases of retinoblastoma according to expressivity of carrier parents (Matsunaga, 1979).

Expressivity of carrier parents	Affected children					
	Bilateral			Unilateral		
	No.	Mean age (mo)	SD	No.	Mean age (mo)	SD
Unaffected	17	13.9	15.41	16	21.5	14.53
Unilateral	20	9.4	8.46	6	15.7	13.49
Bilateral	12	9.3	11.42	1	1	—
Total	49	10.9	11.92	23	19.1	14.41

naga, 1976) と網膜芽細胞腫全国登録 (箕田, 1976) の資料である。この表から、二つの重要な結論が導かれる。第 1 に、保因者親から主遺伝子を受けとって発病した子供のうちで、両眼に発病した 49 例の診断時年齢の平均は 10.9 月であるのに対して、片眼に発病した 23 例ではそれが 19.1 月に伸びている。この所見は、遺伝性片眼例の個体は両眼例の個体よりも癌化に対する抵抗性が強いことを示唆する。

第 2 に、片眼例の診断時平均年齢は、保因者親が非発病のときは 21.5 月であるが、親が片眼罹患のときは 15.7 月と低くなっている。同じ傾向は、両眼罹患児の診断時年齢についてもみられる。この場合、親が両眼罹患のときの患児の診断時平均年齢は、親が片眼罹患のときとほとんど変わらない。しかし両眼性症例の患者が結婚する相手はやはり盲人であることが多いから、子どもの眼の初発症状に気づくのが遅れる傾向がある (Matsunaga and Ogyu, 1976)。このような事情を考慮に入れると、本症遺伝子の発現 (すなわち promotion) に対する宿主抵抗性が、片眼例と両眼例の間ではっきり相違しているだけでなく、同じ片眼例または両眼例のなかでも、それが連続的に変異していることがわかる。

ところで Miyaki ら (1983) は、本症患者の皮膚線維芽細胞のネズミ肉腫ウイルスによる悪性形質転換を調べた結果、13q- 患者の細胞は正常細胞と区別できないが、遺伝性 R の患者の細胞は高い感受性を示し、また同一家系でも、両眼罹患例が片眼罹患例より高い形質転換率を示すことを報告している。後述するように、癌化に対する抵抗性は組織特異的なしきい形質と思われるが、網膜芽細胞と線維芽細胞の間である程度の相関があるのかもしれない。

(3) 細胞質遺伝の可能性 R が非発病保因者を通して遠縁の親族に多発している家系は少なくなく、いったん患者が出ると、その子孫では浸透率が急に高いものになる。このような伝達パターンは、染色体機構によってよく説明される (Strong ら, 1981) が、13q14 欠失の認められない家系例 (Bundey and Morten, 1981) も報告されている。これは、宿主抵抗性の強い個体が毎代選抜された結果、共通の祖先がかくしもっていた主遺伝子の浸透率が次第に低くなり、たまたま抵抗性の弱い個体にその遺伝子が受けつがれて、そこで発病したのだと考えればよく説明できる。一方、これを遅延突然変異で説明する学者があり、Herrmann (1976) はその代表である。

遅発突然変異 (delayed mutation) というのは、Auerbach (1956) が化学的突然変異原で処理したショウジョウバエの実験結果に基づいて提唱した概念で、その分子的基础は不明であるが、不安定な前突然変異 (premutation) を仮定する。この状態にある遺伝子は、元の安定な野生型遺伝子に戻ることさえあれば、完全に変化して突然変異遺伝子になることもある。したがって、その保因者の性腺はモザイクになりやすい。親の性腺がモザイクになっていると、子孫における突然変異個体の出現はきわめて不規則になり、浸透率の低い優性遺伝のパターンに似てくる。しかし一度突然変異個体が出現すると、後は規則正しい遺伝様式を示す。

ところで、不安定な前突然変異の状態をもたらす一つの可能性として、細胞質に寄生する腫瘍ウイルスがある。ヒト adenovirus 12 をヒトの眼球内に注射すると R 様腫瘍が生じ (Mukai ら, 1980)、*in vitro* でヒトの網膜芽細胞がこのウイルス DNA によって悪性転換するという報告 (Byrd ら, 1982) もある。もしこのようなウイルスがヒトでも R の発生に役かっているとすれば、宿主ゲノムに integrate されるまでは母系遺伝のパターンをとることが予想される。そこで、R が遠縁の血縁者に多発している 38 家系を文献から選び、共通祖先から病原因子を伝達した非発病保因者の性別を調べてみた。その結果は、男性保因者が 55 名に対して女性保因者は 44 名であった。また 4 名以上の保因者を通して続けて病原因子が伝えられている家系をみると、どの場合も少なくとも 1 人の男性保因者が介在しており、女性保因者のみを介する伝達例は 1 例もなかった (Matsunaga, 1982b)。こ

Table 6. Distribution of 139 bilateral cases by interval between diagnosis in first and second eyes.

Interval (months)	No. of cases
0	124
1	4
2	1
3	3
5	1
6	1
7	1
8	1
11	1
20	1
41	1
Total	139

Table 7. Reese group of tumors in some of the bilateral cases for which the diagnosis in the second eye was delayed.

Case No.	First diagnosed eye		Second eye	
	Age at diagnosis (month)	Reese group	Age at diagnosis (month)	Reese group
50183	18	II	19	I
50269	5	V	6	I
50175	2	V	3	II
50299	19	V	20	II
52008	5	V	7	III
50414	2	V	9	I
50319	1	V	7	I

The time required for a growing tumor to progress by one grade in the Reese group is less than 2 months and probably about 1 month.

ことから、R の成因として垂直伝達ウイルスによる細胞質遺伝の可能性はないとみてよい。

4. 両眼例における腫瘍発生時期の左右相関

病理学的にみると、両眼例における各眼の腫瘍発生は原則として別々で、一方の眼から他方の眼に腫瘍が転移することはまれな例外とされている (Ellsworth, 1969). ところが両眼例の大多数では、すでに初診時に他眼にも腫瘍が発見されることはよく知られている. 例えば網膜芽細胞腫全国登録の両眼例 139 例についてみると、その 124 例 (89.2%) が初診時にすでに両眼罹患となっている (Table 6). もっともこのような場合でも、腫瘍の進行度を Reese group (Reese, 1976) で測ると、先発眼

の腫瘍の Reese group は平均 4.4 段階に対して、後発眼のそれは 2.2 段階になっている。したがって各眼における腫瘍化の開始時期には差があるが、その差はせいぜい数カ月以内と考えられる。その証拠は、他眼に腫瘍が遅れて発見された症例について分析すると、腫瘍が Reese group で 1 段階進行するのに約 1 カ月しか要しないことが推定されるからである (Table 7)。この程度の差は、対になっている器官で通常認められる左右非対称と等価のものと思われる。つまりこの所見は、保因者のうちで抵抗性が最も弱いと考えられる両眼罹患群では、腫瘍が両眼にほとんど同時に発生していることを示唆している。もちろん両眼性症例のなかには、初発眼の診断後 1 年以上たって他眼に腫瘍が発生するものが少数あるが、これは初発眼の摘出手術後に受けた化学療法や、あるいは初発腫瘍によって誘起された免疫反応などの影響によって、他眼における腫瘍発生が例外的に遅れたものと思われる。

両眼における腫瘍発生の同時性の程度を測るには、左右別の診断時年齢の相関係数を求めればよい (いま一つ別のやり方については Matsunaga, 1982a を参照)。しかし実際には一方の眼に腫瘍が発見されれば、他眼についても眼底検査が行われるのが通則であるから診断は左右独立ではない。そこでわれわれは、1) 腫瘍が Reese group で 1 段階進行するのに平均 1 カ月を要し、2) 他眼の腫瘍が初発眼の腫瘍と同じ Reese group にまで発育したときに、初めて親は患児を連れて眼科医を訪れるという想定のもとに、初発眼の診断とは独立に他眼についての診断が行われたであろう時点の患児の年齢を推定した。例えば、生後 6 カ月の初診時に Reese group V の腫瘍が片眼にみつき、同時に診察した他眼には Reese group I の腫瘍が存在していたとすると、遅発眼の診断時年齢は 10 カ月と推定する。このような補正を加えて左眼と右眼の診断時年齢の相関係数を計算すると、0.82 ($p < 0.001$) となった (Matsunaga, 1979)。

診断時年齢にみられるこのような高い左右相関は、両眼に共通な宿主要因が腫瘍発生に重要な役割をしていること、腫瘍化のヒットがおそらく「分化の誤り」であって、Knudson (1971) の提唱しているような「体細胞突然変異」ではないことを示唆する。なぜならば、対になっている器官が形成されるときには、細胞分化は原則として左右でほぼ同時に進行するので、一方の眼で誤りが起こりやすい時期には、他方の眼でも同じように誤りが起こりやすいとみてよいからである。同じことは、1 個の眼に生じた多巣性腫瘍についても当てはまる。Reese の著書 (1976) には、単眼にほぼ同じ大きさの腫瘍が数個併発した図 (Fig. 3-39 と 3-40) が画かれているが、これも網膜の形態形成が行われるさいに、ほぼ同調的に分化する細胞群があると考えればよく理解できる。他方、突然変異は細胞分裂に伴って random に生起する遺伝子または染色体の変化であるから、同じ効果をもった突然変異が左右でほぼ同時に発生する確率はきわめて低いと考えねばならない。

要するに、遺伝性 R における腫瘍化の第 1 段階のヒットは明らかに突然変異であるが、第 2 段階のヒットは分化の誤りと思われる。この分化の誤りは、宿主抵抗性の強い人では完全に抑制されるが、抵抗性の弱い人にあつては抑制が不完全なために数個の細胞が腫瘍化すると考えられるのである (Matsunaga, 1979)。

5. 保因者の骨肉腫に対する感受性

両眼性 R の患者は、治療のために X 線照射を受けた部位はもちろんのこと、それとは無関係の部位 (たとえば大腿骨) にも、骨肉腫のような第 2 原発性腫瘍を発生しやすい (Sagerman ら, 1969; Jensen and Miller, 1971)。第 2 原発性腫瘍の発生は、非遺伝性が大多数をしめる片眼例ではめったにみられないので、これは本症遺伝子の多面効果の一つとされている (Kitchin and Ellsworth, 1974)。一方、宿主抵抗性説からみると、R の遺伝子を保有していても発病しない個体は癌化に対して抵抗性が最も強く、両眼罹患例は抵抗性が最も弱いことになる。したがって、もし骨肉腫を発生しやすい傾

向が本症遺伝子の多面効果の一つであるならば、宿主抵抗性は組織特異的であるか否か、という問題が生じてくる。

この問いに答えるために、本症患者またはその血縁者で長管骨に骨肉腫を発生した症例を、文献ならびに自験例から集めて分析した (Matsunaga, 1980b)。このような患者 26 例について R の表現型分布をみると、非発病 4、片眼罹患 2、両眼罹患 20 例で、抵抗性が組織特異的であると仮定したときの期待値 (それぞれ 5.4, 3.1, 17.4 例) とよく合致している。換言すると、本症遺伝子を保有している場合、本人が網膜芽細胞の悪性変化に対して強い抵抗性をもっていたからといって、骨芽細胞の悪性変化に対しても抵抗が強いとは限らない。ちなみに Carlson and Desnick (1978) の提唱した突然変異モザイク説によると、非発病保因者は性腺モザイクで、その体細胞には突然変異部位がないものと想定している。もしこの想定が正しければ、非発病保因者では放射線と無関係な骨肉腫は発生しにくいことになるが、これは事実と合わない (Matsunaga, 1981)。

保因者が放射線と関係なく長管骨に骨肉腫を発生する危険率は約 1.2% で、この危険率は正常者に比べると 230 倍も高い。また、上記 26 例の患者のなかには、姉弟ともに両眼性 R と大腿骨の骨肉腫を併発した 1 組 (Schimke ら, 1974) が含まれており、それぞれの組織抵抗性に遺伝が関係していることが示唆される。こうした所見に基づいて、骨肉腫に対する組織抵抗性は、網膜芽細胞腫に対する組織抵抗性と同じく、多因子遺伝のしきい形質とみなされ、その遺伝率は約 70% と推定された (Matsunaga, 1980b)。

Fig. 2. A diagram relating steps in the genesis of retinoblastoma and osteosarcoma to mutagens. [Presumed contents of the black boxes are shown in rectangles (Matsunaga, 1981).

ところで両眼例の患者が X 線照射によって第 2 原発性腫瘍を発生しやすいという事実は、X 線が強い突然変異原であることにかんがみ、Knudson の 2 段階突然変異説を支持するものと解釈されている (Strong, 1977). しかしこの事実は、分化の誤りを抑制している組織特異的な遺伝子 (複数) に自然および誘発突然変異が蓄積される結果であると考えれば、宿主抵抗性説と少しも矛盾しない. このような遺伝子群のなかには、もともと配偶子を通して突然変異したものが伝わっているかもしれないが、X 線その他の環境変異原によってさらに体細胞突然変異が付加されることもあるだろう. いずれにせよ、突然変異した遺伝子の数が一定のしきいを越えたときに初めて、分化の誤りが起こってくると考えるのである. X 線照射を受けてから第 2 原発性腫瘍が発生してくるまでに数年から十数年という長い潜伏期間を要する事実も、このような想定によってよく説明できる. この関係を図示したものが Fig. 2 で、受胎前または妊娠中に X 線照射を受けた母親からうまれた子供では、R を含む小児癌の発生率が高まること (Shiono ら, 1980) から、突然変異原は癌化の第 1 ヒット (優性突然変異) も誘発できるものと想定してある.

6. 宿主抵抗性と関連する多型性遺伝子の探求

網膜芽細胞の悪性変化に対する組織抵抗性に、ある種の多型性遺伝子が関与しているらしいことは、Table 3 と Fig. 1 から容易に想像がつく. そのような遺伝子は、哺乳類の性腺の性を決定する HY 抗原遺伝子のように、組織細胞の正常分化に関係していて、おそらく細胞膜の特異性をきめるものではないかと思われる.

その第 1 の候補にあげられる HLA 抗原については、両眼または片眼罹患の R 患者で B12 の頻度が有意に低く、BW35 の頻度が有意に高いという報告 (Bertrams ら, 1973) があるが、その後の調査では否定的な結果が得られている (Jones, 1974; Gallie ら, 1977). しかしこれらの調査では、宿主抵抗性説からみて必ずしも適切な比較が行われているとはいいがたく、結論はなお持ち越されているとみたほうがよいだろう.

われわれは最近、網膜芽細胞腫全国登録の資料に基づいて、両眼例 193 例と散発性片眼例 346 例の ABO 血液型を調査したところ、その分布は一般集団のそれとよく一致していることを見いだした. しかし両眼例の患者群は、宿主抵抗性に関して一般集団の大多数を代表しており、同じことは、散発性片眼例の大多数をしめる非遺伝性症例の患者群についても言えよう (Matsunaga, 1978). したがってこのような比較では、弱い関連 (weak association) のある場合これを発見することがむずかしい. そこで、宿主抵抗性の最も弱いと考えられる早期発病例 (両眼例では生後 5 カ月以内のもの、散発性片眼例では 18 カ月以内のもの) を選んで検討してみたが、4 型の分布はやはり一般集団のそれとほとんど同じになっていた. このことから、ABO 血液型は R の宿主抵抗性とは関係ないと結論される (Matsunaga and Minoda, 1983).

7. むすび

網膜芽細胞腫は、胎芽期の網膜細胞が最少限のステップの変化を経て悪性化したと考えられ、ヒトで発癌機構を究明するのに好適な腫瘍である. 本症遺伝子の保因者にみられる表現度の変動要因を解析することによって、すでに initiate した細胞が最終的に癌化する過程では、組織特異的な抵抗性遺伝子 (複数) が重要な役割をしていることが判明した. 主遺伝子ならびに抵抗性遺伝子の本体と働きを分子・細胞レベルで明らかにすることが、今後に残された重要な研究課題である.

本研究は、文部省科学研究費および厚生省がん研究助成金の援助によるところが多い.

文 献

- Auerbach, C.H. 1956. A possible case of delayed mutation in man. *Ann. Hum. Genet.* **20**: 266-269.
- Ballesta, F., and Cruz, M. 1978. Chromosomal abnormalities and malignant diseases. *Clin. Genet.* **14**: 277-279.
- Berenblum, I. 1978. Established principles and unresolved problems in carcinogenesis. *J. Natl. Cancer Inst.* **60**: 723-726.
- Bertrams, J., Schildberg, P., Höpping, W., Böhme, U., and Albert, E. 1973. HLA antigens in retinoblastoma. *Tissue Antigens* **3**: 78-87.
- Bundey, S., and Morten, J.E.N. 1981. An unusual pedigree with retinoblastoma. Does it shed light on the delayed mutation and host resistance theories? *Hum. Genet.* **59**: 434-436.
- Byrd, P., Brown, K.W., and Gallimore, P.H. 1982. Malignant transformation of human embryonic retinoblasts by cloned adenovirus 12 DNA. *Nature* **298**: 69-71.
- Carlson, E.A., and Desnick, R.J. 1979. Mutational mosaicism and genetic counseling in retinoblastoma. *Am. J. Med. Genet.* **4**: 365-381.
- Ellsworth, R.A. 1969. The practical management of retinoblastoma. *Trans. Am. Ophthalmol. Soc.* **67**: 462-534.
- Gallie, B.L., Dupont, B., Whitsett, C., Kitchin, F.D., Ellsworth, R.M., and Good, R.A. 1977. Histocompatibility typing in spontaneous regression of retinoblastoma. In *HLA and Malignancy*, Murphy, G.P., Cohen, E., Fitzpatrick, J.E., and Pressman, D. eds., Alan R. Liss, New York, pp. 229-237.
- Hata, A., Suzuki, Y., Fukushima, Y., and Kuroki, Y. 1982. A case of *de novo* reciprocal translocation. 46, XX, t(X;13) (p11;q11) with bilateral retinoblastoma, multiple malformations, and incontinentia pigmenti. *Jpn. J. Hum. Genet.* **27**: 168.
- Herrmann, J. 1976. Delayed mutation as a cause of retinoblastoma: Application to genetic counseling. *Birth Defects: Original Article Series* **12**(1): 79-90.
- Hida, T., Kinoshita, Y., Matsumoto, R., Suzuki, N., and Tanaka, H. 1980. Bilateral retinoblastoma with a 13qXp translocation. *J. Pediat. Ophthalmol. Strabismus* **17**: 144-146.
- Jensen, R.D., and Miller, R.W. 1971. Retinoblastoma: Epidemiologic characteristics. *N. Engl. J. Med.* **285**: 307-311.
- Johnson, M.P., Ramsay, N., Cervenka, J., and Wang, N. 1982. Retinoblastoma and its association with a deletion in chromosome #13: A survey using high-resolution chromosome techniques. *Cancer Genet. Cytogenet.* **6**: 29-37.
- Jones, A.L. 1974. Immunogenetics of retinoblastoma. *Trans. Ophthalmol. Soc. UK* **94**: 945-952.
- Kitchin, F.D., and Ellsworth, R.M. 1974. Pleiotropic effects of the gene for retinoblastoma. *J. Med. Genet.* **11**: 244-246.
- Knudson, A.G., Jr. 1971. Mutation and cancer: Statistical study of retinoblastoma. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* **68**: 820-823.
- Macklin, M.T. 1960. A study of retinoblastoma in Ohio. *Am. J. Hum. Genet.* **12**: 1-43.
- Matsunaga, E., and Ogyu, H. 1959. Genetic study of retinoblastoma in a Japanese population. *Jpn. J. Hum. Genet.* **4**: 156.
- Matsunaga, E. 1976. Hereditary retinoblastoma: Penetrance, expressivity and age of onset. *Hum. Genet.* **33**: 1-15.
- Matsunaga, E., and Ogyu, H. 1976. Retinoblastoma in Japan: Follow-up survey of sporadic cases. *Jpn. J. Ophthalmol.* **20**: 266-282.
- Matsunaga, E. 1978. Hereditary retinoblastoma: Delayed mutation or host resistance? *Am. J. Hum. Genet.* **30**: 406-424.
- Matsunaga, E. 1979. Hereditary retinoblastoma: Host resistance and age at onset. *J. Natl. Cancer Inst.* **63**: 933-939.
- Matsunaga, E. 1980a. Retinoblastoma: Host resistance and 13q- chromosomal deletion. *Hum.*

- Genet.* **56**: 53-58.
- Matsunaga, E. 1980b. Hereditary retinoblastoma: Host resistance and second primary tumors. *J. Natl. Cancer Inst.* **65**: 47-51.
- Matsunaga, E. 1981. Retinoblastoma: Mutational mosaicism or host resistance? *Am. J. Med. Genet.* **8**: 375-387.
- Matsunaga, E. 1982a. Almost synchronous appearance of bilateral retinoblastomas. *Am. J. Med. Genet.* **11**: 485-487.
- Matsunaga, E. 1982b. Hereditary retinoblastoma: Lack of maternal effect. *Hum. Genet.* **62**: 124-128.
- Matsunaga, E., and Minoda, K. 1983. Retinoblastoma and ABO blood groups. *Hum. Genet.* **63**: 87.
- Michalová, K., Klouček, F., and Musilová, J. 1982. Deletion of 13q in two patients with retinoblastoma, one probably due to 13q- mosaicism in the mother. *Hum. Genet.* **61**: 264-266.
- Migdal, C. 1976. Retinoblastoma occurring in four successive generations. *Br. J. Ophthalmol.* **60**: 151-152.
- 箕田健生 1976. 昭和 50 年度網膜芽細胞腫全国登録, 日眼, **80**: 1648-1657.
- Minoda, K. 1978. The International Symposium on Retinoblastoma, Kyoto, May 20-21, 1978. *Jpn. J. Ophthalmol.* **22**: 299-300.
- Miyaki, M., Akamatsu, N., Ono, T., and Sasaki, M.S. 1983. Susceptibility of skin fibroblasts from patients with retinoblastoma to transformation by murine sarcoma virus. *Cancer Lett.* **18**: 137-142.
- Motegi, T. 1981. Lymphocyte chromosome survey in 42 patients with retinoblastoma: Effort to detect 13q14 deletion mosaicism. *Hum. Genet.* **58**: 168-173.
- Motegi, T. 1982. High rate of detection of 13q14 deletion mosaicism among retinoblastoma patients (using more extensive methods). *Hum. Genet.* **61**: 95-97.
- Motegi, T., Komatsu, M., Nakazato, Y., Ohuchi, M., and Minoda, K. 1982. Retinoblastoma in a boy with a *de novo* mutation of a 13/18 translocation: The assumption that the retinoblastoma locus is at 13q141, particularly at the distal portion of it. *Hum. Genet.* **60**, 193-195.
- Mukai, N., Kalter, S.S., Cummins, L.B., and Matthews, V.A. 1980. Retinal tumor induced in the baboon by human adenovirus 12. *Science* **210**: 1023-1025.
- Reese, A.B. 1976. *Tumors of the Eye* (3rd ed.). Harper & Row, New York, pp. 118-119.
- Rivera, H., Turleau, C., de Grouchy, J., Junien, C., Despoisse, S., and Zucker, J.M. 1981. Retinoblastoma-del (13q14): Report of two patients, one with a trisomic sib due to maternal insertion. Gene-dosage effect for esterase D. *Hum. Genet.* **59**: 211-214.
- Sagerman, R.H., Cassady, J.R., Treter, P., and Ellsworth, R.M. 1969. Radiation induced neoplasia following external beam therapy for children with retinoblastoma. *Am. J. Roentgenol.* **105**: 529-535.
- Sasaki, M.S. 1982. Dominantly expressed procancer mutations and induction of chromosome rearrangements. *Progr. Mut. Res.* **4**: 75-84.
- Schimke, R.N., Lowman, J.T., and Cowan, G.A. 1974. Retinoblastoma and osteogenic sarcoma in siblings. *Cancer* **34**: 2077-2079.
- Shinohara, T., Miyata, H., Kaneko, M., Suzuki, M., and Kato, H. 1981. Retinoblastoma and interstitial deletion of chromosome 13, 46, XX, del(13) (pter→q12::q14→qter). *Jpn. J. Hum. Genet.* **26**: 146-147.
- Shiono, P.H., Chung, C.S., and Myrianthopoulos, N.C. 1980. Preconception radiation, intrauterine diagnostic radiation, and childhood neoplasia. *J. Natl. Cancer Inst.* **65**: 681-686.
- Sparkes, R.S., Sparkes, M.C., Wilson, M.G., Towner, J.W., Benedict, W., Murphree, A.L., and Yunis, J.J. 1980. Regional assignment of genes for human esterase D and retinoblastoma to chromosome band 13q14. *Science* **208**: 1042-1044.
- Sparkes, R.S., Murphree, A.L., Lingua, R.W., Sparkes, M.C., Funderburk, S., and Benedict, W.F. 1982. Assignment of the gene for dominant retinoblastoma to chromosome 13q14 by linkage to esterase D. The 2nd International Symp. of Retinoblastoma, Oct. 29-30, 1982, Monterey, Calif., U.S.A.

- Strong, L.C. 1977. Theories of pathogenesis: Mutation and cancer. In *Genetics of Human Cancer* (Mulvihill, J.J., Miller, R.W., and Fraumeni, J.F., Jr., eds.). Raven Press, New York, pp. 401-415.
- Strong, L.C., Riccardi, V.M., Ferrel, R.E., and Sparkes, R.S. 1981. Familial retinoblastoma and chromosome 13 deletion transmitted via an insertional translocation. *Science* **213**: 1501-1503.
- Vogel, F. 1979. Genetics of retinoblastoma. *Hum. Genet.* **52**: 1-54.
- Ward, P., Packman, S., Loughman, W., McMahon, A., and Albin, A. 1980. Location of the retinoblastoma susceptibility gene(s). *Am. J. Hum. Genet.* **32**: 93A.
- Yunis, E., Zuñiga, R., and Ramirez, E. 1981. Retinoblastoma, gross internal malformations, and deletion 13q14→q31. *Hum. Genet.* **56**: 283-286.
- Yunis, J.J., and Ramsay, N. 1978. Retinoblastoma and subband deletion of chromosome 13. *Am. J. Dis. Child.* **132**: 161-163.